XXII Congresso Brasileiro de Microbiologia

ÁREA - INFECÇÃO HOSPITALAR

**"Sensibilidade a antifúngicos em
amostras hospitalares do
gênero Candida"**

Prof^a. Dr^a. Claudete Rodrigues Paula

Laboratório de Leveduras Patogênicas - ICB/USP

Pesquisadores Envolvidos

- Prof. Dr. Augusto Cezar Montelli - UNESP
- Prof^a. Dr^a. Claudete Rodrigues Paula - ICB/USP
- Prof^a. Dr^a. Maria de Fátima Sugisaki - UNESP
- Mestranda - Elza Helena da Silva - ICB/USP
- Doutorando - Eriques Gonçalves da Silva - ICB/USP
- Doutoranda - Flavia Emi Matsumoto - ICB/USP
- Doutoranda - Luciana da Silva Ruiz - UNESP/USP
- Prof^a. Sônia Khouri - UNIVAP/SP

NOVOS GRUPOS

- Prof. Dr. Francisco de Assis Baroni - UFRRJ/RJ
- Prof^a. Dr^a. Junia Hamdan - UFMG/MG
- Prof^a. Dr^a. Marcia Melhem - IAL/SP

O QUE É UMA INFECÇÃO HOSPITALAR OU NOSOCOMIAL?

➔ **Infecção Hospitalar:** É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares (MONTELLI, Comunicação Pessoal).

➔ **Desafio do Século XXI**

➔ **Alta taxa de mortalidade**

➔ **Resistência aos poucos fármacos (intrínseca e adquirida)**

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES

- ❖ 8% dos pacientes que ingressam nos hospitais podem adquirir uma infecção hospitalar fúngica.
- ❖ Nesse grupo a mortalidade costuma ser elevada.
- ❖ Infecção Hospitalar em UTI Neonatal pode variar de 2% - 10%, com mortalidade variando de 15 a 45%, dependendo do agente etiológico.

IMPORTANCIA DAS INFECÇÕES FUNGICAS HOSPITALARES

Últimas décadas

Avanços da tecnologia na área médica

Introdução de novos métodos diagnósticos e técnicas cirúrgicas, novos biomateriais para próteses, sondas, cateteres, avanços na quimioterapia de tumores, novos antibióticos e técnicas de transplantes de órgãos.

Maior sobrevida de doentes críticos (AIDS, Imunodeprimidos, Neutropênicos, e transplantados.

↑Risco de aquisição de infecções fúngicas

Infecções Fúngicas:

- ✓ Leveduroses - (Candidiase e Criptococose)
- ✓ Aspergilose
- ✓ Leveduras emergentes

Fungemias Hospitalares:

- Infecções fúngicas da corrente sanguínea adquirida na maioria das vezes de microbiota autóctone do paciente ;
- Uso de antibacterianos aumenta a colonização de *Candida* no trato gastrointestinal;
- Imunidade baixa (AIDS, uso de corticóides, doença maligna, quimioterapia, radioterapia, desnutrição, idade avançada, neutropenia;
- Cateter, sondas.

Infecção Fúngica do Trato Uninário: (Candidúria)

- Cateterização Urinária;
- Agentes predominantes: *Candida albicans* e *Candida glabrata*;
- Patologia urinária sugestiva: 10.000 ufc/mL;
- Hemácias, leucócitos, leveduras, pseudo-hifas.

Candida spp:

✓ *Candida* - importância médica -

↑ Grupo dominante de infecção fúngica nos hospitais

Projeto NNIS (1970)

{ Fungemia
Candidemia
Candiduria

1975 - Não estava entre os dez agentes etiológicos

1984 - 8º lugar;

1989 - 4º lugar;

2002 - 3º lugar.

ESPÉCIES NÃO - *ALBICANS* (resistência aos antifúngicos)

- ✓ Reservatórios em potencial
- ✓ Modo de transmissão dentro do ambiente hospitalar

Candida albicans - ↑ Fungemia – sítios predominantes clinicamente importantes

(já descritos cepas resistentes a Anfotericina B, estudos?)

- ✓ ↑ de sp não *albicans* causando infecções significativas:
C. tropicalis, *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, *C. krusei*,
C. lusitaniae e *C. dubliniensis*

- ✓ Seleção das sp menos sensíveis pelo uso de antifúngicos;
 - ✓ Discussão do uso profilático de antifúngicos.

Candida tropicalis:

✓ Infecções endógenas; colonização prévia do trato gastrointestinal e outros sítios antes de causar fungemia e formas sistêmicas de candidiase. Resistência a vários azólicos de última geração

Candida parapsilosis:

✓ infecções exógenas; sem prévia colonização em outros
✓ sítios; fungemia, endocardite, artrite e peritonite.
(CATETER) - Formação de Biofilmes que "protege" a levedura contra os fármacos.

Candida krusei:

✓ Colonização prévia do trato gastrintestinal e outros sítios, causando fungemia e formas sistêmicas de candidiase. (resistência ao fluconazol)

Candida lusitanae:

✓ infecção endógena, sendo a mesma cepa que coloniza e, posteriormente, invade o trato urinário, respiratório e circulatório do paciente.

Candida glabrata:

- ✓ ↑ virulência ; coloniza vários sítios em um mesmo paciente (cepas resistentes aos azólicos)

fungemia com alta letalidade (candidúria)

Alguns estudos recentes ocupa o 2º lugar em frequência depois de *C. albicans*

Epidemiologia da Transmissão Nosocomial por *Candida*

Não existem métodos de tipagem ideais

Sistemas

Marcadores
fenotípicos

"morfotipagem"
"micocinas killer"
"enzimas"

Padrão de suscetibilidade
a agentes antifúngicos

(NCCLS), (EUCAST), ("Kits")

Marcadores
moleculares

RFLP, PCR,
cariotipagem

Critérios utilizados para a determinação da sensibilidade aos antifúngicos:

- THORNSBERRY & SABATH -- (o mais tradicional) - nível sérico da droga (1986)
- NCCLS ("standard") - Documento M27 - A2 - (2002)
- EUCAST (NCCLS - modificado) - Doc. E. Dis. 7.1.(2002)

Agente antifúngico	Sensível CIM	Sensível Dose - dependente CIM	Resistente CIM
Fluconazol	≤ 8	16 - 32	≥ 64
Itraconazol	$\leq 0,125$	0,25 - 0,5	≥ 1
5-Fluorocitosina	≤ 4	-	≥ 32
Anfotericina B	-	-	> 2

NCCLS - "breakpoints" (mg/mL) para espécies de *Candida*

MÉTODOS EMPREGADOS PARA SE ESTABELECEER A SENSIBILIDADE DE AMOSTRAS DE LEVEDURAS AOS ANTIFÚNGICOS

- 1 - NCCLS – Macro e Microdiluição;**
- 2 – EUCAST – Leitura em espectrofotômetro;**
- 3 – “Kits” comerciais = “E – Test” (boa concordância); discos com os fármacos, “Candifast”**

FATORES IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES

- ✓ Preparação do fármaco – (diluição, tampão);**
- ✓ Preparação e inóculo fúngico;**
- ✓ Meio de cultivo;**
- ✓ Temperatura e tempo de leitura;**
- ✓ Cepas padrões com CIM(s) conhecidos;**
- ✓ Instruções do fabricante (Kits);**
- ✓ Pessoas que conduzem os testes e leiam os resultados.**

RESULTADOS DA PESQUISA

- Critério = NCCLS (2002);
- Método = "E - Test" (AB-BIODISK, SUÉCIA)
(boa concordância, rapidez e fácil execução);
- Amostras = 300;
- Meio de cultivo = RPMI + MOPS
(Leitura 48 hs, temperatura = 35°C).

Sensível ? - Resistente ?

"IN VIVO"

- Composição do fármaco;
- Interação Medicamentosa;
- Farmacocinética da droga;
- Absorção pelo paciente;
- Risco X Benefício (toxicidade, reações adversas);
- Profilaxia;
- (Pensar sempre nestes fatores)

HOSPITAL I: HOSPITAL PÚBLICO INFANTIL DE SÃO PAULO (1999-2002)

HOSPITAL I - HOSPITAL PÚBLICO INFANTIL DE SÃO PAULO - SP (sangue, cateter e urina)

- Nº de leitos → 100
- atendimento de crianças → 0 a 15 anos
- classe → renda baixa
- clínicas com maior nº de casos → **UTI Neonatal**
- Dados de 1999 a 2002

Freqüência das espécies de leveduras isoladas de sangue, cateter e urina de crianças hospitalizadas

PROTEINASE E FOSFOLIPASE

Atividade da proteinase com índice 3: 81% das amostras

Atividade da fosfolipase com índice 3: 24% das amostras

SENSIBILIDADE ÀS TOXINAS "KILLER"

Biotipos mais freqüentes: 511 (56%) e 888 (38%)

Padrão “killer”, atividade enzimática e espécies de leveduras isoladas em associação de pacientes provenientes de Hospital Público Infantil de São Paulo, SP.

Paciente	Mat. Clin./Cateter	Espécie	Killer	Proteinase	Fosfolipase
1	Cateter*	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,21	(-)
	Sangue	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,19	(-)
2a	Cateter*	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,15	(-)
	Sangue	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,15	(-)
2b	Sangue	<i>C. guilliermondii</i>	811	0,14	(-)
	Sangue	<i>C. guilliermondii</i>	888	0,15	(-)
3a	Cateter*	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,33	(-)
	Sangue	<i>C. parapsilosis</i>	888	0,25	(-)
3b	Cateter*	<i>C. guilliermondii</i>	888	0,80	(-)
	Sangue	<i>C. guilliermondii</i>	888	0,27	(-)
4	Cateter*	<i>T. cutaneum</i>	888	(-)	(-)
	Sangue	<i>T. cutaneum</i>	888	(-)	(-)
5	Cateter*	<i>C. albicans</i>	511	0,25	0,71
	Urina	<i>C. albicans</i>	514	0,25	0,70

Pacientes 2 e 3 (“a” e “b”) → Amostras isoladas em duas ocasiões

* Cateter venoso

Perfil genotípico- RFLP- das espécies de leveduras em associação de pacientes internados em Hospital Público Infantil de São Paulo.

*P1 Marcador de peso molecular-Kb

*Colunas 5 e 6: Paciente 2a (cateter/sangue)

*Colunas 8 e 9: Paciente 3a (cateter/ sangue)

Formação de biofilme em cateter por amostra de *C. parapsilosis*

Resultados de CIM50 e CIM90 das amostras frente aos antifúngicos

Espécies	CIMs (µg/mL)									
	Cetoconazol		Itraconazol		Fluconazol		Anfotericina B		5Fluorocitosina	
	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90
<i>C. albicans</i>	>32	>32	>32	>32	>256	>256	0,75	1,5	2,0	>32
<i>C. parapsilosis</i>	0,19	>32	0,023	2,0	8,0	32	0,75	2,0	>32	>32
<i>C. tropicalis</i>	>32	>32	>32	>32	>256	>256	0,75	3,0	>32	>32
<i>C. guilliermondii</i>	0,25	4,0	0,047	4,0	6,0	12	0,5	6,0	>32	>32
<i>C. glabrata</i>	0,38	12	1,5	>32	24	>32	0,5	3,0	0,75	>32
<i>Trichosporon sp</i>	6,0	>32	1,0	8,0	24	>256	4,0	4,0	>32	>32

CIM50 - Concentração fungicida ou fungistática que inibe 50% das amostras

CIM90 - Concentração fungicida ou fungistática que inibe 90% das amostras

SENSIBILIDADE ANTIFÚNGICA

Porcentagem de amostras sensíveis segundo os critérios do NCCLS

Espécies de <i>Candida</i> (N°)	Antifúngicos n(%)					
	5FC	KZ	FZ	IZ	AB	VZ
<i>C. albicans</i> (16)	8(50)	5(31)	5(31)	7(44)	11(69)	6(66.7)
<i>C. parapsilosis</i> (28)	7(25)	20(71)	25(89)	24(86)	21(75)	12(100)
<i>C. tropicalis</i> (11)	3(27)	0	1(9)	1(9)	6(55)	5(83)
<i>C. guilliermondii</i> (7)	2(29)	4(57)	6(86)	4(57)	3(43)	6(100)
<i>C. glabrata</i> (11)	8(73)	5(45)	7(64)	3(27)	8(73)	1(100)
<i>C. krusei</i> (2)	1(50)	2(100)	2(100)	2(100)	0	1(100)
<i>Trichosporon sp</i> (5)	1(20)	0	3(60)	1(20)	1(20)	-
Total (80)	30(38)	36(45)	49(61)	38(48)	50(63)	31(87)

HOSPITAL II: HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DE
BOTUCATU, SP

HOSPITAL II - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, SÃO PAULO - FUNGEMIA

- Nº de leitos → 375

- atendimento de crianças e adultos

- classe → renda baixa

- clínicas com maior nº de casos → **UTI neonatal**

- Dados de 1999 a 2001

Frequência das espécies de leveduras isoladas de sangue de pacientes internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, SP.

Sensibilidade das 75 amostras de *Candida* isoladas de sangue de pacientes internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, SP, frente aos antifúngicos estudados.

Droga Antifúngica	MIC ($\mu\text{g/mL}$)		
	MIC 50	MIC 90	Variações do MIC
Cetoconazol	0.154	13.25	0.016 - $\geq$ 32
Fluconazol	6.09	126	0.016 - $\geq$ 256
5-Fluorocitosina	0.012	0.079	0.002 - $\geq$ 32
Anfotericina B	0.135	0.89	0.002 - $\geq$ 32
Itraconazol	0.016	0.718	0.002 - $\geq$ 32

Cetoconazol $\rightarrow$ concentração de 0.002 a 32 $\mu\text{g/mL}$

Fluconazol $\rightarrow$ concentração de 0.016 a 256 $\mu\text{g/mL}$

5-Fluorocitosina $\rightarrow$ concentração de 0.002 a 32 $\mu\text{g/mL}$

Anfotericina B $\rightarrow$ concentração de 0.002 a 32 $\mu\text{g/mL}$

Itraconazol $\rightarrow$ concentração de 0.002 a 32 $\mu\text{g/mL}$

Perfil de sensibilidade das leveduras segundo critério do NCCLS

Espécies de <i>Candida</i> (nº)	Droga Antifúngica n (%)					
	5-Fc	Ke	Fl	Itra	AB	Vz†
<i>C. albicans</i> (29)*	27(93)	25(86)**	23(79)	24(83)	29(100)	13(93)
<i>C. parapsilosis</i> (23)	23(100)	23(100)	15(65)	6(78)	21(91)	7(85)
<i>C. tropicalis</i> (09)	7(78)	5(56)	5(56)	6(67)	9(100)	6(67)
<i>C. krusei</i> (08)	8(100)	8(100)	5(63)	6(75)	8(100)	2(100)
<i>C. guilliermondii</i> (05)	4(80)	5(100)	1(20)	1(20)	5(100)	2(100)
<i>C. glabrata</i> (01)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	-
Total (75)	70(93)	67(89)	52(64)	44(75)	73(97)	30(86)

Distribuição, segundo o serviço médico, das 75 amostras de leveduras isoladas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, SP.

HOSPITAL III: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ, SP

HOSPITAL III - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ-SÃO PAULO (sangue, cateter e secreções)

- N° de leitos → 170

- atendimento de crianças e adultos

- classe → renda baixa

- clínica com maior n° de casos →

UTI adultos

- Dados de 2002 a 2003

Freqüência das espécies de Leveduras Isoladas de Diversos Materiais Clínicos em um Hospital Público de Taubaté - SP

Espécies	Quantidade	Porcentagem
<i>Candida albicans</i>	40	37%
<i>Candida tropicalis</i>	25	24%
<i>Candida parapsilosis</i>	21	20%
<i>Candida glabrata</i>	09	9%
<i>Candida rugosa</i>	02	2%
<i>Candida norvagensis</i>	01	1%
<i>Candida krusei</i>	01	1%
<i>Candida guilliermondii</i>	01	1%
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	01	1%
<i>Trichosporon asahii</i>	02	2%
<i>Hansenula sp.</i>	01	1%
Não identificado	01	1%
Total	105	100%

Freqüência das leveduras do gênero *Candida* isoladas de diversos materiais clínicos de Hospital Universitário de Taubaté

Resultados de CIM50 e CIM90 das amostras frente aos antifúngicos

Espécies	CIMs (µg/mL)									
	Cetoconazol		Itraconazol		Fluconazol		AnfotericinaB		5Fluorocitosina	
	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90
<i>C. albicans</i>	0,023	>32	0,38	>32	1,0	>256	0,125	>32	1,0	>32
<i>C. parapsilosis</i>	0,032	>32	0,064	>32	1,0	4,0	0,25	>32	>32	>32
<i>C. tropicalis</i>	1,5	>32	>32	>32	4,0	>256	1,5	3,0	2,0	>32
<i>C. glabrata</i>	1,0	>32	>32	>32	>256	>256	0,75	>32	1,5	6,0

Porcentagem de amostras sensíveis segundo os critérios do NCCLS

Espécies de <i>Candida</i> (N°)	Antifúngicos n(%)				
	5FC	KZ	FZ	IZ	AB
<i>C. albicans</i> (17)	19(74)	20(74)	23(81)	19(70)	20(74)
<i>C. parapsilosis</i> (13)	6(46)	9(69)	12(92)	8(62)	6(46)
<i>C. tropicalis</i> (14)	7(50)	4(29)	11(79)	4(29)	5(36)
<i>C. glabrata</i> (6)	5(83)	1(17)	2(33)	1(17)	4(67)
Total (60)	37(62)	34(57)	48(80)	32(53)	35(58)

HOSPITAL IV: HOSPITAL PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, RJ

Perfil de sensibilidade frente a antifúngicos de leveduras isoladas em Hospital Público do Rio de Janeiro, RJ - Fungemia

Espécies de <i>Candida</i> (n=40)	Droga Antifúngica (%)				
	5-Fc	Ke	Fl	Itra	AB
<i>C. albicans</i> (13)*	-	8	25	17	58
<i>C. parapsilosis</i> (15)	0	53	33	13	13
<i>C. tropicalis</i> (04)	0	25	0	25	50
<i>C. guilliermondii</i> (05)	0	60	20	0	0
<i>C. famata</i> (02)	0	0	0	0	0
<i>C. lusitaniae</i> (01)	0	0	0	0	0

Teste de difusão em ágar – perfil de sensibilidade segundo fabricante (CECON)

Prof. Dr. Francisco de Assis Baroni – UFRRJ

Mestrando Geraldo Oliveira - UFRRJ

ANTIFÚNGICOS ESTUDADOS

➤ Polienicos

➤ AnfotericinaB*

✓ Nistatina

✓ Fluorocitosina*

➤ Azólicos

✓ IMIDAZÓLICOS

✓ Cetoconazol*

✓ Miconazol

✓ TRIAZÓLICOS]

✓ Fluconazol*

✓ Itraconazol*

NOVOS ANTIFÚNGICOS

➤ TRIAZÓLICOS

✓ VORICONAZOL*;

✓ POSOCONAZOL;

✓ RAVUCONAZOL

✓ CASPOFUNGINA.

(único que age na parede)

Perfil de Sensibilidade de 300 Amostras Hospitalares de Leveduras, São Paulo-SP

ESPÉCIES DE LEVEDURAS (N°)	5- Fluorocitosina	Cetoconazol	Fluconazol	Itraconozol	Anfotericina B	Voriconazol [†]
<i>C. albicans</i> (138)*	88**	87	88	83	100	82
<i>C. parapsilosis</i> (64)	56	81	81	78	94	95
<i>C. tropicalis</i> (48)	52	48	50	40	85	75
<i>C. glabrata</i> (23)	78	52	65	30	83	71
<i>C. guilliermondii</i> (12)	50	75	58	42	67	100
<i>C. krusei</i> (10)	90	100	70	80	90	100
<i>Trichosporon sp</i> (05)	20	0	60	20	20	-
Total (300)	70	74	75	67	90	84

Empregamos o “Kit” comercial “E-Test” (AB-BIODISK-Suécia).

(*) Número de amostras testadas.

(**) Percentual de amostras sensíveis.

(†) Foram estudadas 100 amostras frente ao voricomazol.

LEVEDURAS

CANDIDA

PORTANTO...

- ❖Faz-se necessário estabelecer e padronizar testes de sensibilidade antifúngica "in vitro", factíveis, na tentativa de controlar as infecções fúngicas nosocomiais e minimizar o risco da emergência de resistência a antifúngicos;
- ❖Diagnóstico adequado (casuística subestimada)
- ❖Necessidade de realizar estudos de correlação dos resultados "in vitro" e "in vivo";
- ❖Pesquisa de novos fármacos:
- ❖Realização de simpósios e afins, sobre o tema, reunindo os vários grupos de pesquisadores brasileiros.